

PCT/JP2004/015784

28.10.2004

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

REC'D 18 NOV 2004

WIPO

PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 1 0 月 3 0 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 3 7 0 2 1 6
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 3 7 0 2 1 6]

出 願 人 シスメックス株式会社
Applicant(s):


**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 9 月 2 7 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



出証番号 出証特 2 0 0 4 - 3 0 8 6 4 3 6

【書類名】 特許願
【整理番号】 PSYS0304
【提出日】 平成15年10月30日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 G01N 33/574
【発明者】
 【住所又は居所】 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号 シスメックス株
 式会社内
 【氏名】 中野 浩一
【発明者】
 【住所又は居所】 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号 シスメックス株
 式会社内
 【氏名】 渡邊 美晴
【特許出願人】
 【識別番号】 390014960
 【氏名又は名称】 シスメックス株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100109793
 【住所又は居所】 大阪市中央区上汐2丁目6-13 喜多ビル202号
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 神谷 恵理子
 【電話番号】 06-4304-5510
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 171481
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲**【請求項 1】**

子宮頸部細胞群の検体から腺癌の有無を診断するための試薬であって、サイトケラチン 8 抗体を含有する診断薬。

【請求項 2】

さらに H I K 1 0 8 3 抗体を含有する請求項 1 又は 2 に記載の診断薬。

【請求項 3】

サイトケラチン 8 抗体を含有する第 1 試薬、及び

サイトケラチン 8 抗体に結合可能で且つ標識されている 2 次抗体を含有する第 2 試薬を含む子宮腺癌の試薬キット。

【請求項 4】

子宮頸部細胞群の検体から腺癌細胞を検出する方法であって、

前記細胞群とサイトケラチン 8 抗体とを反応させる工程を含む検出方法。

【請求項 5】

子宮頸部細胞群の検体から腺癌細胞を検出する方法であって、

前記細胞群とサイトケラチン 8 抗体を含む試薬とを反応させる工程；

未反応液を除去して、細胞群を回収する工程；及び

回収された細胞群から、前記サイトケラチン 8 抗体と腺癌細胞の複合体を検出する工程を含む腺癌細胞の検出方法。

【請求項 6】

前記検体は、子宮頸部組織又は個々に分散された細胞群である請求項 4 又は 5 に記載の検出方法。

【請求項 7】

扁平上皮癌細胞と腺癌細胞を含む子宮頸部細胞群の検体から、腺癌細胞を分別する方法であって、

前記細胞群と標識されたサイトケラチン 8 抗体とを反応させる工程；及び

前記サイトケラチン 8 抗体と腺癌細胞の複合体を検出する工程を含む分別方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】子宮腺癌の診断薬及び腺癌細胞の検出方法

【技術分野】

【0001】

本発明は、子宮頸部の細胞群から腺癌細胞の有無を特異的に検出する腺癌診断薬及び腺癌細胞の検出方法に関する。

【背景技術】

【0002】

子宮頸部癌は、扁平上皮癌と腺癌に分類され、子宮頸部癌の95%は扁平上皮癌であると言われているが、近年腺癌の比率が増加しつつある。腺癌は比較的若年者層に多発し、予後が悪いため臨床上問題となっている(Lea JS, Sheets EE, Wenham RM, Duska LR, Coleman RL, Miller DS, Schorge JO. Gynecol Oncol. 2002;84(1):115-119.)。

【0003】

一般的な細胞診、すなわちパパニコロウ染色で細胞を染色し、その形態から悪性度を判定する方法では、腺癌細胞が正常と悪性細胞の形態が類似しているため、腺癌を見つけ出すことは困難である(Chang WC, Matisic JP, Zhou C, Thomson T, Clement PB, Hayes MM. Cancer. 1999;87(1):5-11.)(Gallup DG, Harper RH, Stock RJ. Gynecol. 1985;65(3):416-422.)。このため、腺癌については見逃されやすく、細胞診では陰性と判定されたにもかかわらず、症状と局所所見から腺癌の可能性が高い場合が多い。

【0004】

病理組織診では、癌細胞による細胞配列での乱れなどを観察することができるため、細胞診より発見の度合いが高いが、生検の採取には痛みを伴うため、単なる健康診断レベルには適用できない。

【0005】

一方、細胞診であっても、癌細胞に特異的なマーカーが存在すればより適格な診断が可能となる。子宮癌に関する腫瘍マーカーとしては、従来よりSCC(squamous cell carcinoma)がよく知られている。SCCは、扁平上皮癌組織より抽出されたSCC抗原であり、このSCC抗原に対するSCC抗体は、扁平上皮癌の検出に対して有効である。しかしながら、SCC抗体は腺癌に対する陽性率は低く、また腺癌に対して特異的ではないため、扁平上皮癌と区別することはできない。また、早期癌に対する陽性率も高くないので、早期発見を主目的とする検診用診断薬としては、有効とは言い難い。

【0006】

この他、細胞内に存在する繊維状タンパクであるサイトケラチンをマーカーとして、このケラチンマーカーに直接結合できるサイトケラチン抗体を診断薬として利用することが提案されている(特許文献1)。

【0007】

例えば、非特許文献1には、サイトケラチン8抗体を用いて大腸癌を検出することが開示されている。また、特許文献2には、サイトケラチン19と結合するモノクローナル抗体を用いる子宮癌検出試薬が開示されている。しかし、サイトケラチン19は、腺癌細胞のみならず、扁平上皮癌とも反応するため、扁平上皮癌と腺癌の区別には用いることができない。

【0008】

【特許文献1】USP4775620

【特許文献2】USP5288614

【非特許文献1】Makin CA, Bobrow LG, Bodmer WF

出証特2004-3086436

Monoclonal antibody to cytokeratin for use in routine histopathology. J Clin Pathol. 1984 ; 37 (9) : 975-983.

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

本発明は、以上のような事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、細胞診用に取り上げられた子宮頸部細胞群から、腺癌細胞の有無を判定できる診断薬、特に扁平上皮癌細胞と区別して腺癌を特異的に検出できる診断薬又は診断薬キット、及び腺癌細胞の検出方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0010】

本発明の腺癌診断薬は、子宮頸部細胞群の検体から腺癌の有無を診断するための試薬であって、サイトケラチン8抗体を含有する。さらにH I K 1 0 8 3抗体を含有してもよい。

【0011】

本発明の子宮腺癌の試薬キットは、サイトケラチン8抗体を含有する第1試薬、及びサイトケラチン8抗体に結合可能で且つ標識されている2次抗体を含有する第2試薬を含む。

【0012】

本発明の腺癌細胞の検出方法は、子宮頸部細胞群の検体から腺癌細胞を検出する方法であって、前記細胞群とサイトケラチン8抗体とを反応させる工程を含む。さらに、未反応液を除去して、細胞群を回収する工程；及び回収された細胞群から、前記サイトケラチン8抗体と腺癌細胞の複合体を検出する工程を含んでもよい。前記検体は、子宮頸部組織であってもよいし、個々に分散された細胞群であってもよい。

【0013】

本発明の分別方法は、扁平上皮癌細胞と腺癌細胞を含む子宮頸部細胞群の検体から、腺癌細胞を分別する方法であって、前記細胞群と標識されたサイトケラチン8抗体とを反応させる工程；及び前記サイトケラチン8抗体と腺癌細胞の複合体を検出する工程を含む。

【発明の効果】

【0014】

本発明の診断薬及び診断薬キットは、腺癌細胞に特異的なマーカーであるサイトケラチン8と結合できるサイトケラチン8抗体を含有しているので、細胞形態的に類似している正常腺細胞と腺癌細胞を区別することができ、また扁平上皮癌細胞とも区別することができる。よって、本発明の診断薬又は診断薬キットを用いれば、組織診断はもちろん、個々の分散された細胞群からも腺癌細胞を特異的に検出することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0015】

本発明の子宮頸部腺癌診断薬は、サイトケラチン8抗体を含む。

サイトケラチンは細胞質内繊維状構造物の一つで、その中の中間径フィラメントを形成するタンパク質群に属する。サイトケラチン8は、腺癌細胞の他、扁平上皮癌細胞、正常な腺細胞、扁平上皮細胞にも含まれるが、その含有量は、腺癌細胞が圧倒的に多い。従って、サイトケラチン8抗体は、腺癌細胞に優先特異的に結合するので、正常細胞、扁平上皮癌細胞の中から、腺癌細胞を検出することができる。

【0016】

本発明に用いられるサイトケラチン8抗体は、サイトケラチン8と結合できる部位を有する抗体であればよく、F cフラグメントの構造、F a bの不変領域などは特に限定しない。例えば、ダコ・サイトメーション社から市販されている「抗ヒトサイトケラチン8、35 H 1 1マウスモノクローナル抗体」を使用することができる。

【0017】

本発明の腺癌診断薬には、サイトケラチン 8 抗体の溶媒として、生理食塩水、リン酸系緩衝液等が含有されることが好ましく、具体的には、リン酸緩衝化生理食塩水 (PBS)、界面活性剤入り PBS (例えば PBST) が好ましく用いられる。

【0018】

また、本発明の診断薬には、サイトケラチン 8 抗体の他、HIK1083 抗体を含有することができる。サイトケラチン 8 抗体のみを用いた場合でも子宮頸部腺癌を検出できるが、特に検体に粘液が大量に含まれている場合などには、サイトケラチン 8 抗体と反応しにくい場合がある。この点、HIK1083 抗体は、卵巣癌細胞及び子宮頸部腺癌細胞の産生する粘液 (特殊なムチン) に対して特異的に反応する。よって、サイトケラチン 8 抗体と HIK1083 抗体との併用により、子宮頸部腺癌をほぼ 100% 近く検出することが可能となる。

【0019】

本発明の診断薬は、サイトケラチン 8 をマーカーとして腺癌細胞を検出するために、サイトケラチン 8 抗体自体を標識してもよいし、サイトケラチン 8 抗体を一次抗体とし、この一次抗体と結合する二次抗体を標識してもよい。この場合、本発明の試薬は、サイトケラチン 8 抗体を含有する第 1 試薬、及び標識された二次抗体を含有する第 2 試薬の組合わせからなる診断薬キットとなる。

【0020】

一次抗体 (サイトケラチン 8 抗体)、二次抗体の標識としては、特に限定せず、蛍光物質、放射性物質、酵素など、従来より公知の標識化合物を用いることができる。

【0021】

本発明の診断薬又は診断薬キットは、サイトケラチン 8 抗体と腺癌細胞との反応の特異性を高めるために、予め検体の組織表面を、特異性のないタンパク質 (例えば血清) で覆ってしまうことが好ましい。従って、本発明の診断薬又は診断薬キットは、サイトケラチン 8 抗体の標的となるタンパク質以外のタンパク質に対する非特異的反応をブロックするための試薬 (ブロック試薬) と組合わせて用いることが好ましい。

【0022】

ブロック試薬としては、特異性のないタンパク質、すなわち血清、IgG、BSA、スキムミルクなどを用いることができ、適宜生理食塩水等で希釈したものであってもよい。

【0023】

次に、本発明の腺癌検出方法について説明する。

本発明の腺癌細胞の検出方法は、検体をサイトケラチン 8 抗体と反応する工程を含む。

【0024】

本発明の腺癌検出方法の対象となる検体は、子宮頸部細胞群であって、採取した組織であってよいし、個々の細胞に分散させた細胞群であってよい。

ここで、組織は粘液除去処理の必要はないが、分散された細胞群においては粘液除去処理を行うことが好ましい。

【0025】

粘液除去方法としては特に限定しないが、細胞の形態等に影響を与えることがないようにすることが好ましい。例えば、本発明者が提案しているシステイン系化合物を用いて粘液を除去する方法を適用してもよい (特願 2003-348073 号参照)。

【0026】

個々の細胞に分散する方法としては、細胞の形態を壊すことなく分散させることが好ましい。例えば、本発明者が提案している方法、アルデヒド化合物等で安定化した後、プロテアーゼで処理することが好ましい (特願 2003-359336 号参照)。

【0027】

このような検体を、サイトケラチン 8 抗体と反応させるにあたり、前処理として、ブロック試薬で非特異的反応が生じ得る検体のタンパク質をブロックしておくことが好ましい。

【0028】

ブロック試薬としては、上記本発明の診断薬で挙げたような、血清、I g G、B S A、スキムミルク等を用いることができる。

【0029】

非特異的反応をブロックした検体を、サイトケラチン8抗体と反応させる。ここで、検体が組織の場合には、組織表面にサイトケラチン8抗体含有液と組織を接触させた状態で、30分ほど、静置しておくだけでよい。

【0030】

検体が個々に分散された細胞群の場合には、サイトケラチン8抗体含有液と細胞群とが均一になるように混和することにより反応させる。

反応後、過剰な抗体含有液を除去する。

【0031】

サイトケラチン8抗体自体が標識付けられている場合には、未反応のサイトケラチン8抗体を除去した後、腺癌細胞とサイトケラチン8抗体の結合物を、サイトケラチン8抗体の標識に基づいて検出すればよい。

【0032】

一方、サイトケラチン8抗体が標識されていない場合、別途標識化合物と反応させる必要がある。サイトケラチン8抗体との結合部位を有し且つ標識化合物が結合された二次抗体と反応させ、標識に基づいてサイトケラチン8抗体と腺癌細胞の複合体を検出する。

【0033】

本発明で用いることができる標識化合物は、特に限定しないが、C y 3 (A m e r s h a m L i f e S c i e n c e社の登録商標)等のシアニン系色素、フルオレセインイソシアネート(F I T C)、ローダミン、量子ドットなどの蛍光物質；金粒子などの光散乱物質；フェライトなどの吸光物質；ヨード(^{125}I)等の放射性物質；ペルオキシダーゼ、アルカリフォスファターゼ、D A B (3, 3'-ジアミノベンチジンテトラヒドロクロライド)、グルコースオキシダーゼ等の酵素などが挙げられる。

【0034】

標識化合物(二次抗体)を反応させた後、余分な標識液を除外し、標識に適した方法で観察する。例えば、蛍光標識であれば、蛍光を検出すればよい。

なお、各工程と工程の間で、適宜検体を洗浄することが好ましい。

【0035】

本発明の検出方法において、さらにH I K 1 0 8 3抗体と反応させる工程を含んでいてもよい。サイトケラチン8抗体は、細胞骨格に対する抗体であり、粘液を産生する一部の細胞とは反応しにくい。一方、H I K 1 0 8 3抗体は、癌細胞から産生される粘液と特異的に反応する。よって、サイトケラチン8抗体とH I K 1 0 8 3抗体を併用することにより、癌細胞を100%の効率で検出することが可能となる。よって、サイトケラチン8抗体とH I K 1 0 8 3抗体との併用により、検体たる細胞や組織の粘液除去状況等にそれ程、影響されることなく、腺癌細胞を、高感度で検出することができる。

【0036】

ここで、H I K 1 0 8 3抗体とサイトケラチン8抗体を併用する場合、サイトケラチン8抗体との反応工程と、H I K 1 0 8 3抗体との反応工程の順番は、特に限定しない。H I K 1 0 8 3抗体と反応させ、洗浄後、サイトケラチン8抗体と反応させてもよいし、まずサイトケラチン8抗体と反応させ、洗浄後、H I K 1 0 8 3抗体と反応させてもよい。また、サイトケラチン8抗体とH I K 1 0 8 3抗体の双方を含有する試薬を用いて、これを検体と反応させてもよい。

【実施例】

【0037】

[サイトケラチン8抗体の特異性]

(1) 免疫組織化学での検定

ヒト子宮腺癌の生検サンプルで、ホルマリンで固定したパラフィン包埋薄切標本の脱パラフィン処理を行った後、100%キシレン中に、室温で10分間静置した。次いで10

0%エタノール中に、室温で30秒間静置した後、80%エタノール、続いて70%エタノール中で、それぞれ室温で30秒間静置した。次に、蒸留水中に、室温で30秒間静置した。

【0038】

1%ヤギ血清を含むPBST (0.05%Tween 20を含有するPBS (リン酸緩衝生理食塩水) 液) 中で、室温で10分間静置することにより、非特異的タンパク質をブロックした。

5 μ g/mlのサイトケラチン8抗体含有液 (溶媒は1%ヤギ血清を含むPBST) を、サンプル上に静置し、室温にて30分間静置して、抗体反応をさせた。

【0039】

反応後、未反応の抗体反応液を吸引除去した後、PBST中で、室温で5分間の振盪洗浄を3回繰り返した。

【0040】

蛍光色素Alexa 488 (Molecular Probes社の商品名) で標識されたヤギ由来の抗マウスIgGのF(ab)₂フラグメント (溶媒は1%ヤギ血清を含むPBST) 5 μ g/mlを組織上に静置し、抗体反応をさせた。反応終了後、未反応の抗体含有液を吸引除去した後、PBST中で、室温で5分間の振盪洗浄を3回行った。洗浄後、50%マウンティングメディウムを含むPBSTを重ねし、カバーガラスをかけて、蛍光顕微鏡で観察したところ、図1に示す写真を与えた。

【0041】

参考のために、同生検サンプルをヘマトキシリンエオジンで染色した場合の写真を図2に示す。

図2からわかるように、異常部位 (腺癌部分) では、核が大きくなっている。これと対応する図1において、異常部位には蛍光で染色されたことが確認された。従って、サイトケラチン8抗体は、正常な組織には反応せず、腺癌部分にだけ反応することがわかる。

【0042】

(2) 正常扁平上皮組織及び正常腺組織とサイトケラチン8抗体での検定

採取した生検サンプルで、正常扁平上皮組織及び正常腺組織について、上記と同様の操作を行った。

蛍光染色した正常扁平上皮組織の蛍光顕微鏡写真を図3に示す。

蛍光染色した正常腺組織の蛍光顕微鏡写真を図4に示す。

【0043】

(3) 免疫細胞化学での検定

検体として、正常扁平上皮細胞である口腔粘膜扁平上皮細胞の培養細胞 (ネガティブコントロール)、子宮頸部扁平上皮癌細胞由来の培養細胞系であるC33A、及び子宮頸部腺癌由来の培養細胞系であるHeLa細胞を用いた。

【0044】

各培養細胞サンプル液を100%メタノールで固定した後、遠心分離 (10000rpm、1分、4℃) にかけて、上清を除去して、細胞を回収した。

回収した細胞を、PBSおよびPBSTを各1ml添加し、洗浄する。再度遠心分離 (10000rpm、1分、4℃) に掛け、上清を分離して、細胞を回収した。続けて、1%ヤギ血清を含むPBSTを1ml添加し、室温にて10分間振盪混和して、細胞表面の非特異的タンパクのブロックを行った。ブロック後、遠心分離 (10000rpm、1分、4℃) にかけて、余分なブロッキング液を除去した。

【0045】

次に、5 μ g/mlのサイトケラチン8抗体含有液 (溶媒は1%ヤギ血清を含むPBST) を添加し、室温にて30分間振盪混和して、抗体反応をさせた。反応後、遠心分離 (10000rpm、1分、4℃) にかけて、未反応の抗体液を除去した。

PBSTを1ml添加して細胞を洗浄し、上清を除去して、細胞を回収した。

【0046】

蛍光色素 Alexa 488 で標識されたヤギ由来の抗マウス IgG の F (a b)₂ フラグメント含有液 (溶媒は 1 % ヤギ血清を含む P B S T) 5 μ g / m l を添加し、室温にて 30 分間振盪混和して、抗体反応をさせた。反応後、遠心分離 (10000 r p m、1 分、4 $^{\circ}$ C) にかけて、上清を除去して細胞を回収した。

【0047】

P B S T を 1 m l 添加して細胞を洗浄し、遠心分離 (10000 r p m、1 分、4 $^{\circ}$ C) にかけて、上清を除去して、細胞を回収した。

50 % グリセロールを含む P B S 液中に再懸濁して、蛍光顕微鏡で観察した。結果を図 5 ~ 7 に示す。

【0048】

図 6 及び図 7 より、扁平上皮細胞にはサイトケラチン 8 抗体は反応しないことが認められた。一方、子宮頸部腺癌細胞に対しては、蛍光部分が観察され、サイトケラチン 8 抗体と腺癌細胞が反応することが確認できた (図 5)。

【産業上の利用可能性】

【0049】

本発明の腺癌診断薬は、子宮頸部細胞群の組織及び個々に分散した細胞群から、腺癌を特異的に検出できるので、子宮頸部腺癌、特に扁平上皮癌と腺癌とを区別したい診断薬、診断に利用できる。本発明の腺癌細胞検出方法は、子宮頸部細胞群の組織及び個々に分散した細胞群から、腺癌を特異的に検出したい場合に利用できる。

【図面の簡単な説明】

【0050】

【図 1】 子宮頸部腺癌を有する組織検体の蛍光顕微鏡写真 (200 倍) である。

【図 2】 子宮頸部腺癌を有する組織検体をヘマトキシリンエオジン染色した顕微鏡写真 (200 倍) である。

【図 3】 正常子宮頸部扁平上皮組織の蛍光顕微鏡写真 (200 倍) である。

【図 4】 正常子宮頸部腺組織の蛍光顕微鏡写真 (200 倍) である。

【図 5】 子宮頸部腺癌細胞 (H e L a 細胞) の蛍光顕微鏡写真 (400 倍) である。


【図 6】 子宮頸部扁平上皮癌細胞 (C 3 3 A 細胞) の蛍光顕微鏡写真 (400 倍) である。

【図 7】 口腔粘膜の扁平上皮細胞の蛍光顕微鏡写真 (400 倍) である。

【書類名】 図面


【図 1】

蛍光染色



【図 2】

Hematoxylin Eosin染色



【図 3】

正常扁平上皮組織




【図 4】

正常腺組織



【図 5】

HeLa
(子宮頸部腺癌)



【図 6】

C33A
(子宮頸部扁平上皮癌)



【図 7】

口腔粘膜扁平上皮
(ネガティブコントロール)



【書類名】 要約書**【要約】**

【課題】 細胞診用に採取された子宮頸部細胞群から、腺癌細胞の有無を判定できる診断薬、特に扁平上皮癌細胞と区別して腺癌を特異的に検出できる診断薬又は診断薬キット、及び腺癌細胞の検出方法を提供する。

【解決手段】 子宮頸部細胞群のうち腺癌細胞に最も多く含まれるサイトケラチン8をサイトケラチン8抗体又はこの二次抗体を用いて腺癌細胞を検出する。H I K 1 0 8 3抗体を併用することにより、検出感度を上げることができる。対象とする検体は、子宮頸部組織であってもよいし、個々に分散された細胞群であってもよい。

【選択図】 図1

特願 2003-370216

出願人履歴情報

識別番号

[390014960]

1. 変更年月日
[変更理由]

1998年10月 7日

名称変更

住所変更

住 所
氏 名

神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号
シスメックス株式会社